

## Anexo 5

### Acreditación de Actividades de Formación Continuada de Profesiones Sanitarias

Jornadas de Vacunas de la AEP. Toledo, 22-23 de abril de 2016

#### Test-prueba previa

(una sola respuesta correcta)

1	<b>¿Qué actitud le parece más razonable ante unos padres que se niegan a vacunar a su hija?</b>	
	A	Notificar la negativa al profesional de Trabajo social y al Fiscal de menores
	B	Anotarlo sin más en su historia clínica
	C	<b>Explorar sus motivos, informar detalladamente, evitar la confrontación y dejar abierta la posibilidad de reconsiderar el tema más adelante</b>
	D	Pedirle que se cambie de pediatra

2	<b>En España, la vacunación infantil no es obligatoria, salvo en una de las siguientes circunstancias</b>	
	A	Si es un inmigrante que no tiene ninguna de las vacunas de nuestro calendario infantil
	B	<b>Si hay una epidemia que suponga un riesgo para la salud pública</b>
	C	Cuando inicia la escolarización antes de los 3 años
	D	Si tiene una enfermedad crónica

3	<b>¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto a la varicela y su vacuna considera INCORRECTA?</b>	
	A	Los más afectados son los niños menores de 14 años y de ellos, los menores de 6 años
	B	<b>La enfermedad es benigna y no da lugar a morbilidad importante, secuelas ni mortalidad</b>
	C	La vacunación frente a varicela en la primera infancia, especialmente con dos dosis, es la medida más eficaz para prevenir la enfermedad y sus posibles complicaciones
	D	El aumento de la incidencia del herpes zóster en el adulto y el anciano tras la inclusión de la vacuna en la edad pediátrica no ha podido ser demostrado de forma fehaciente a día de hoy

4	<b>¿Cuál considera que es la mejor pauta de vacunación frente a la varicela?</b>	
	A	Una dosis a los 12 meses
	B	Una dosis a los 12 años
	C	Dos dosis a partir de los 12 años
	D	<b>Dos dosis a partir de los 12 meses</b>

5	<b>En relación a la seguridad y eficacia de las vacunas disponibles frente a rotavirus, es CORRECTO decir que ...</b>	
	A	Son eficaces para disminuir cualquier GEA por rotavirus, pero no las hospitalizaciones asociadas
	B	Son eficaces pero el riesgo de invaginación asociado hace que se empleen sólo en zonas endémicas
	C	<b>No evitan la enfermedad al 100%, pero en caso de padecerla será un cuadro más leve y reducen de manera significativa las hospitalizaciones asociadas y las formas graves de la enfermedad</b>
	D	No son seguras

6	<b>¿En cuál de las siguientes situaciones está contraindicada la vacunación frente a rotavirus?</b>	
	A	Prematuridad
	B	Lactante VIH+ asintomático sin inmunodepresión
	C	Intolerancia a la lactosa
	D	<b>Antecedentes de invaginación intestinal</b>

7	<b>Respecto a la difteria, cual de las siguientes afirmaciones es CIERTA</b>	
	A	Es una enfermedad inmunoprevenible, ya erradicada en el mundo, y que sólo excepcionalmente se presentan casos de enfermedad
	B	<b>Es una infección bacteriana, de transmisión aérea o por fómites contaminados, siendo el hombre enfermo o el portador asintomático la fuente de contagio</b>
	C	Es una enfermedad inmunoprevenible de la infancia, con escasas complicaciones y

	baja mortalidad
D	En el momento actual no existe tratamiento disponible

<b>8</b>	<b>Señale la respuesta CORRECTA respecto a la seguridad de la vacuna frente al virus del papiloma humano (VPH)</b>
A	Está demostrado un pequeño pero significativo aumento en el número de fallecimientos entre 1 y 3 meses después de la administración de la vacuna
B	Diversos estudios epidemiológicos han mostrado una asociación estadísticamente significativa entre la vacuna y la aparición de enfermedades autoinmunes
C	La tasa de reacciones anafilácticas supera en más del doble a la de otras vacunas sistemáticas
<b>D</b>	<b>Los datos de seguimiento poscomercialización confirman que los efectos secundarios de la vacuna frente al VPH son leves y no justifican la restricción de su uso</b>

<b>9</b>	<b>Ante la aparición de una reacción adversa tras una vacunación inyectable, en forma de hinchazón en la zona de la inyección, con aumento de calor local y que se mantiene durante 48 horas, ¿qué haría con la siguiente dosis?</b>
A	Posponerla y administrarla, al menos, 3 meses más tarde de la fecha prevista
<b>B</b>	<b>Aplicarla cuando corresponda</b>
C	Administrar una dosis de dexclorfeniramina profiláctica, una hora antes de la inyección
D	Aplicar la vacuna cuando corresponda, pero en el miembro contralateral

<b>10</b>	<b>Un niño de 6 años presentó a los 18 meses, dos días después de la administración de la vacuna pentavalente (DTPa+Hib+VPI), un cuadro neurológico etiquetado de encefalitis, sin secuelas en la actualidad. ¿Cuál de las siguientes opciones sería la correcta?</b>
<b>A</b>	<b>No administrar Tdpa, pero sí Td en su lugar</b>
B	No administrar Tdpa, ni Td
C	Vacunar con Tdpa en medio hospitalario
D	Vacunar en el centro de salud con cualquier vacuna