

Recomendaciones campaña 2009-2010

Vacunación en la infancia y adolescencia frente a gripe estacional

La vacunación antigripal frente a la gripe estacional es una estrategia especialmente efectiva cuando se dirige a los grupos de población considerados de riesgo, que son aquellos individuos que por su condición o patología de base pueden presentar formas graves, complicaciones y mayor mortalidad cuando adquieren dicha enfermedad. Muchos niños y adolescentes pertenecientes a estos grupos de riesgo no reciben por distintas razones dicha vacunación anual. Es necesario hacer entre todos un esfuerzo para transmitir a todo el personal sanitario y a la población, especialmente a los padres y a los individuos pertenecientes a los grupos de riesgo, la recomendación de la vacunación antigripal anual frente a gripe estacional. En relación a la infancia y a la adolescencia, el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría recomienda la vacunación de:

1. Niños mayores de 6 meses y adolescentes pertenecientes al grupo de riesgo por presentar alguna de las siguientes patologías de base:
 - Enfermedad respiratoria crónica (incluyendo asma).
 - Enfermedad cardiovascular crónica.
 - Enfermedad metabólica crónica (diabetes...).
 - Enfermedad renal o hepática crónica.
 - Individuos con inmunodepresión o inmunodeficiencia (congénita o adquirida).
 - Asplenia funcional o anatómica.
 - Enfermedad neuromuscular crónica.
 - Enfermedades hematológicas moderadas-graves.
 - Niños y adolescentes (de 6 meses a 18 años) en tratamiento continuado con ácido acetilsalicílico.
 - Sd. de Down.
2. Niños mayores de 6 meses y adolescentes que son contactos domiciliarios (convivientes) de pacientes (niños o adultos) pertenecientes a grupos de riesgo.

También deben vacunarse frente a gripe estacional los adultos que son contactos domiciliarios (convivientes o cuidadores) de niños, adolescentes o adultos que pertenecen a los grupos de riesgo. Es especialmente importante la vacunación del entorno familiar cuando existen lactantes menores de 6 meses de edad con factores de riesgo, ya que estos no pueden recibir la vacuna.

Los niños mayores de 6 meses no pertenecientes a grupos de riesgo pueden vacunarse frente a gripe estacional si sus padres lo solicitan o su pediatra lo considera oportuno.

Madrid, 30 de septiembre de 2009

Comité Asesor de Vacunas

Asociación Española de Pediatría