





# Gripe: ¿En qué momento estamos?

## Mensajes finales

# Mensajes para casa...

## La gripe es muy importante (y hay que tomarla en serio)



**Niños: donde hay más casos de gripe**

**Niños: vector de transmisión más importante**

**0 - 4 AÑOS: Misma tasa de hospitalización que en >65 años**

**2 de cada 3 niños ingresados por gripe SON NIÑOS SANOS**

**1 de cada 2 niños fallecidos por gripe SON NIÑOS SANOS**

# Vacunación antigripal universal en el niño

**VACUNACION  
SI**



**LA GRIPE NO SIEMPRE ES LEVE  
PUEDE PRODUCIR COMPLICACIONES  
A VECES GRAVES, INCLUSO MUERTE  
MÁS CASOS EN NIÑOS SANOS**

**LLEGADA VACUNAS MEJORES Y  
MEJOR TOLERADAS**

**BENEFICIO PERSONAL**

**BENEFICIO COLECTIVO (INM GRUPO)**

- Mejores coberturas, incluido grupos de riesgo
  - Disminución de casos
  - Disminución complicaciones y hospitalizaciones
  - Disminución de fallecimientos
  - Descenso consumo recursos sanitarios
- 
- Menor circulación viral
  - Inmunidad de grupo para adultos (>65 años) y grupos de riesgo



# Vacunación antigripal universal en el niño

## Debate abierto sobre la vacunación antigripal universal en niños

- Vacunas tetravalentes
- Efectividad parecida con TIV y LAIV en Europa
- Mejor aceptabilidad a priori con LAIV, facilitando implantación de programas de vacunación universal





# Vacunación antigripal 2016-2017

## Recomendaciones del CAV-AEP



CAV  
Comité Asesor de Vacunas

Vacunación frente a la  
gripe estacional en la  
infancia y la adolescencia

RECOMENDACIONES DEL  
COMITÉ ASESOR DE VACUNAS DE LA  
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA (CAV-AEP)  
PARA LA CAMPAÑA ANTIGRI PAL 2016-2017

- SEGUIMOS INSISTIENDO EN LA VACUNACIÓN DE LOS NIÑOS DE **RIESGO** >6 MESES Y SUS **CONVIVIENTES**
- VACUNACION **PROFESIONALES** SANITARIOS

- **Niños de riesgo: <50%**
- **Profesionales sanitarios: <30%**

# Vacunación antigripal 2016-2017

## Recomendaciones del CAV-AEP

### RESUMEN DE LAS RECOMENDACIONES DEL CAV-AEP PARA LA CAMPAÑA ANTIGRIPIAL 2016-2017

Con relación a la infancia y la adolescencia, el CAV-AEP recomienda la vacunación antigripal en:

- Grupos de riesgo: niños a partir de los 6 meses de edad y adolescentes en determinadas situaciones o con enfermedades de base.
- Niños sanos a partir de los 6 meses de edad, adolescentes y adultos sanos que convivan con pacientes de riesgo.
- Miembros del entorno familiar cuando existan lactantes menores de 6 meses de edad con factores de riesgo, ya que estos no pueden recibir la vacuna antigripal.
- Todos los profesionales sanitarios.

Se recomienda emplear preferentemente vacunas antigripales tetraivalentes, tanto inactivadas para uso por vía intramuscular (aunque no va a ser distribuida esta temporada por decisión del fabricante) como atenuadas por vía intranasal, con las indicaciones y posología de sus fichas técnicas correspondientes.

El CAV-AEP considera que la vacunación antigripal de los lactantes mayores de 6 meses, no incluidos en grupo de riesgo, si sus padres lo solicitan y su pediatra lo considera conveniente, es una medida recomendable dada la elevada tasa de complicaciones asociadas a la gripe en este grupo de edad.

# Vacunación antigripal 2016-2017

## Recomendaciones del CAV-AEP

### RESUMEN DE LAS RECOMENDACIONES DEL CAV-AEP PARA LA CAMPAÑA ANTIGRIPIAL 2016-2017

Con relación a la infancia y la adolescencia, el CAV-AEP recomienda la vacunación antigripal en:

- Grupos de riesgo: niños a partir de los 6 meses de edad y adolescentes en determinadas situaciones o con enfermedades de base.
- Niños sanos a partir de los 6 meses de edad, adolescentes y adultos sanos que convivan con pacientes de riesgo.
- Miembros del entorno familiar cuando existan lactantes menores de 6 meses de edad con factores de riesgo, ya que estos no pueden recibir la vacuna antigripal.
- Todos los profesionales sanitarios.

Se recomienda emplear preferentemente vacunas antigripales tetravalentes, tanto inactivadas para uso por vía intramuscular (aunque no va a ser distribuida esta temporada por decisión del fabricante) como atenuadas por vía intranasal, con las indicaciones y posología de sus fichas técnicas correspondientes.

El CAV-AEP considera que la vacunación antigripal de los lactantes mayores de 6 meses, no incluidos en grupo de riesgo, si sus padres lo solicitan y su pediatra lo considera conveniente, es una medida recomendable dada la elevada tasa de complicaciones asociadas a la gripe en este grupo de edad.



*Gracias por vuestra  
atención*