

Recomendaciones de vacunación pediátrica frente a la covid (mayo/2023)

Edad	Vacuna y composición	Inmunocompetentes ^a		Inmunodepresión y muy alto riesgo ^b	
		Serie primaria	Primer refuerzo	Serie primaria	Primer refuerzo
6-59 meses	Comirnaty 3 mcg	-	No aprobado	4 dosis [3 semanas entre dosis 1 y 2; ≥8 semanas entre las demás]	No aprobado
5-11 años	Comirnaty 10 mcg	2 dosis (≥8 semanas entre dosis)	≥5 meses [en casos de alto riesgo, Min. Sanidad, 7/mar/2023]	3 dosis [3 semanas entre dosis 1 y 2; ≥8 semanas entre dosis 2 y 3]	≥3 meses después de la serie primaria
	Comirnaty Original/Ómicron BA.4-5 (5/5 mcg)				
12-17 años	Comirnaty 30 mcg	2 dosis (≥8 semanas entre dosis)	≥5 meses [en casos de alto riesgo, Min. Sanidad, 7/mar/2023]	3 dosis [3 semanas entre dosis 1 y 2; ≥4 semanas entre dosis 2 y 3]	≥3 meses después de la serie primaria
	Comirnaty Original/Ómicron BA.4-5 (15/15 mcg)				
		^a Al menos ≥5 meses desde la última infección documentada		^b Al menos ≥3 meses desde la última infección documentada	

• https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/vacunasCOVID19_Profesionales.htm

• <https://vacunasaep.org/> • @CAV_AEP • 4 de mayo de 2023