CONFLICT OF INTEREST

- He colaborado en actividades docentes subvencionadas por GSK, MSD, Sanofi y AstraZeneca y como consultor en Advisory Board para MSD, GSK i Pfizer.
- He recibido ayuda económica de Sanofi y Pfizer para asistir a actividades docentes nacionales e internacionales.
- Pertenezco al Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones de la Asociación Española de Pediatría.

SARAMPION

Un alerta sanitaria

TEXAS
Health and Human
Services

Texas announces first death in measles outbreak

The Texas Department of State Health Services is reporting the **first death from measles** in the ongoing outbreak in the South Plains and Panhandle regions. The **school-aged child who was not vaccinated** was hospitalized in Lubbock last week and tested positive for measles.

Immunizarse con **2 dosis de la una vacuna MMR** (CDC: 12-15 meses y 4-6 años). Con ello **se previenen más del 97 por ciento de las infecciones** por sarampión. Un pequeño número de **personas vacunadas** puede contraer sarampión, aunque los **síntomas son más leves** y son menos transmisores. Los niños demasiado **pequeños** para ser vacunados tienen más **complicaciones graves**.

El SAS insta a vacunarse del sarampión a los que no lo estén tras el aumento casos en Málaga

El responsable del programa de vacunación de Andalucía indica que se estudia adelantar la segunda dosis, pero insiste en que la clave está en tener los dos pinchazos puestos o haber pasado la patología

Salud contabiliza 25 casos confirmados de sarampión desde enero en la provincia de Málaga

Hay un incremento de casos de **sarampión** en **Andalucía**. Los **42** contabilizados en los **primeros dos meses del 2025** en la comunidad autónoma son casi los mismos que los acumulados en **todo el 2024 (53 casos)**, según los datos del Ministerio de Sanidad.

David Moreno explicó que los brotes registrados ocurrieron en personas relacionadas con **Marruecos o países del Este**, países con coberturas vacunales bajas. Al viajar allí o recibir a familiares que vienen a visitarlos, si no hay una correcta vacunación, se produce la transmisión.

Servei de Vigilància Epidemiològica
Vallès Occidental i Vallès Oriental

Nota informativa: Xarampió

Situació del Xarampió, 11/03/2025

En **enero de 2024**, la OMS ya emitió una alerta sobre el aumento de casos, con más de **306.000 casos en todo el mundo**. En Europa, **Entre 1/11/2024 y el 31/1/2025 se han notificado 32.265 casos en 30 países de UE/EEE, con 19 muertes (Rumanía)**.

En Marruecos en 2025 ya hay 20.086 casos y 37 muertes (desde 2024 más de 40.000 casos y 150 muertes). Otros países con mucha incidencia son del sudeste asiático como **Vietnam y Tailandia**.

De los **61 casos confirmados en Cataluña entre 2024 y 2025** el **31,7% son importados**. En el **2025 ya se han confirmado 23 casos** de Sarampión en Cataluña.

El último caso de sarampión notificado en el Vallès:

Hacia 6 días que había llegado de **Marruecos**.

No estaba vacunado.

En **periodo de transmisión fue 3 veces a visitarse a 2 centros sanitarios**

150 contactos estrechos, la mayoría en salas de espera de centros sanitarios. Sólo se controlaron el 46,4%.

A photograph of a baby being held by two people, overlaid with a blue semi-transparent filter. The baby is in the center, looking towards the camera. The hands of the people holding the baby are visible around the baby's body. The text "EL SARAMPION EN CIFRAS" is centered over the image in white, bold, uppercase letters.

EL SARAMPION EN CIFRAS

Measles

World Health Organization

<https://www.cdc.gov/global-measles-vaccination/data-research/global-measles-outbreaks/>

Measles Incidence Rate per Million (12M period: feb/2024 -jan/2025)

Highest incidence rates

Country	Cases	Rate
Kyrgyzstan	12940	1,800.72
Romania	27314	1,436.44
Kazakhstan	18805	913.19
Azerbaijan	8586	830.64
Iraq	25264	548.72
Yemen	21457	528.72
Bosnia and Herzegovina	1578	498.70
Liberia	2040	363.45
Burkina Faso	6790	288.34
Eq. Guinea	474	250.46

Map production: World Health Organization, 2025. All rights reserved
Data source: IVB Database

Disclaimer: The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the World Health Organization concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Dotted and dashed lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be full agreement.

Measles case distribution by month and WHO Region (2017-2025)

Based on data received 2025-03 - Data Source: IVB Database - This is surveillance data, hence for the last month(s), the data may be incomplete.

XVI JORNADAS DE INMUNIZACIONES | aep | aepCAV | GIJÓN, 21 Y 22 DE MARZO DE 2025 | vacunasaep.org

Rate of measles cases and deaths in the United States, 1919 to 2024

Our World in Data

The reported annual rate of new cases and deaths from measles, per 100,000 people in the population.

Table Chart

1 fallecido en 2003 y 2015 y 2 fallecidos en 2025
ninguno vacunado

1919 2024

Data source: US Census Bureau (1944); Public Health Reports (1993); Centers for Disease Control and Prevention (1994; 2025) – [Learn more about this data](#)

OurWorldinData.org/vaccination | CC BY

XVI JORNADAS DE INMUNIZACIONES
GIJÓN, 21 Y 22 DE MARZO DE 2025
vacunasaeop.org

Measles

U.S. Cases in 2024

Total cases

285

Age

Under 5 years: **120 (42%)**

5-19 years: **88 (31%)**

20+ years: **77 (27%)**

Vaccination Status

Unvaccinated or Unknown: **89%**

One MMR dose: **7%**

Two MMR doses: **4%**

U.S. Hospitalizations in 2024

40%

40% of cases hospitalized (114 of 285) for isolation or for management of measles complications.

Percent of Age Group Hospitalized

Under 5 years: **52% (62 of 120)**

5-19 years: **25% (22 of 88)**

20+ years: **39% (30 of 77)**

U.S. Cases in 2025

Total cases

222

Age

Under 5 years: **76 (34%)**

5-19 years: **99 (45%)**

20+ years: **40 (18%)**

Age unknown: **7 (3%)**

Vaccination Status

Unvaccinated or Unknown: **94%**

One MMR dose: **4%**

Two MMR doses: **2%**

U.S. Hospitalizations in 2025

17%

17% of cases hospitalized (38 of 222).

Percent of Age Group Hospitalized

Under 5 years: **28% (21 of 76)**

5-19 years: **11% (11 of 99)**

20+ years: **13% (5 of 40)**

Age unknown: **14% (1 of 7)**

XVI JORNADAS DE INMUNIZACIONES | **aep** **aepCAV**
GIJÓN, 21 Y 22 DE MARZO DE 2025
vacunasaep.org

Measles cases from 1 February 2024 to 31 January 2025

In the most recent 12-month period, from 1 February 2024 to 31 January 2025, 30 EU/EEA Member States reported a total of 32 265 cases of measles.

Between 1 February 2024 and 31 January 2025, of the 32 265 cases with known age, 14 556 (45.1%) were in children under five years of age; and 8 721 (27.0%) cases were aged 15 years or older. The highest notification rates were observed in infants under one year of age (1052.2 cases per million) and children aged 1-4 years (617.1 cases per million).

Of 29 481 cases (100.0% of all cases) with a known age and vaccination status, 25 503 (86.5%) were unvaccinated, 2 583 (8.8%) were vaccinated with one dose of a measles-containing vaccine, 1 304 (4.4%) were vaccinated with two or more doses, and 52 (0.2%) were vaccinated with an unknown number of doses.

Nineteen deaths (case fatality rate (CFR): 0.1) attributable to measles were reported to ECDC during the 12-month period by Romania (18) and Ireland (one).

Measles case distribution (EUR), 2020-2025

Nineteen deaths (case fatality rate (CFR): 0.1) attributable to measles were reported to ECDC during the 12-month period by Romania (18) and Ireland (one) (Figure 4).

Figure 4. Number of measles deaths by month and year, EU/EEA, 1 February 2024 to 31 January 2025

Measles cases: Romania

ELIMINATION STATUS: **ENDEMIC**

XVI JORNADAS DE IMMUNIZACIONES **aep** **aepCAV**
GIJÓN, 21 Y 22 DE MARZO DE 2025
vacunasaep.org

MENS VNC
 VRS Tdap RV VPH Poliovirus DTPa GRIPE
 VPI Varicela Hib VPI Hib
 Rotavirus HEPATITIS B
 Haemophilus influenzae tipo b MNINGOCOCOS
 VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO ACWY Meningococo B NEUMOCOLO
 SARS-CoV-2
 MENS VNC
 VRS Tdap RV VPH Poliovirus DTPa GRIPE
 VPI Varicela Hib VPI Hib
 Rotavirus HEPATITIS B
 Haemophilus influenzae tipo b MNINGOCOCOS
 VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO ACWY Meningococo B NEUMOCOLO
 SARS-CoV-2
 MENS VNC
 VRS Tdap RV VPH Poliovirus DTPa GRIPE
 VPI Varicela Hib VPI Hib
 Rotavirus HEPATITIS B
 Haemophilus influenzae tipo b MNINGOCOCOS
 VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO ACWY Meningococo B NEUMOCOLO
 SARS-CoV-2

Measles cases: Spain

ELIMINATION STATUS: **VERIFIED**

Age distribution, vaccination status and incidence (last 12 months)

WHO/UNICEF Coverage Estimates (WUENIC)

— Incidence ■ 2+ doses

<https://www.cdc.gov/global-measles-vaccination/data-research/global-measles-outbreaks/>

XVI JORNADAS DE INMUNIZACIONES **aep** **aepCAV** GIJÓN, 21 Y 22 DE MARZO DE 2025 **vacunasaep.org**

MENS VNC VRS Tipo RV VPH Poliovirus DTPa GRIPE
 VPI Varicela Hib VPI Hib
 Rotavirus HEPATITIS B
 Haemophilus influenzae tipo b MENINGOCOCOS
 VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO ACWY Meningococo B NEUMOCOLO

CLASIFICACIÓN DE LOS CASOS SOSPECHOSOS DE SARAMPIÓN

Tabla 4. Casos acumulados desde el 01/01/2024 hasta el 29/12/2024 (Semana 52)

CC.AA	Casos notificados	En Investigación	Clasificación de origen de la infección					Casos descartados				
	Total	Total	Endémico	Importado	Relacionado importación	Desconocido/ en investigación	Total	Rubéola	Casos Vacunales	Otro Diagnóstico	Sin Diagnóstico	Total
Andalucía	53			7	13	7	27			3	23	26
Aragón	17			2	4	1	7			3	7	10
Asturias	1						0		1			1
Baleares	5			2	2	1	5					0
Canarias	29			2	3	2	7			5	17	22
Cantabria	0						0					0
Castilla-La Mancha	78			6	50	0	56		2	6	14	22
Castilla y León	5			0	2	2	4				1	1
Cataluña	106			10	16	5	31		2	1	72	75
C. Valenciana	52			12	12	4	28		3	10	11	24
Extremadura	27			0	9	1	10		1	5	11	17
Galicia	11			1	1	0	2			6	3	9
Madrid	27			3	19	3	25			1	1	2
Murcia	5			2	0	3	5					0
Navarra	3			1			1			2		2
País Vasco	10			3	4	2	9				1	1
La Rioja	0						0					0
Ceuta	0						0					0
Melilla	1						0			1		1
Total	430	-	-	51	135	31	217	-	9	43	161	213

Otros diagnósticos (diferentes de Rubéola) Sd. Kawasaki, infección por estreptococo A (escarlatina); enfermedad mano-pie-boca, probable reacción alérgica; virus de Epstein-Barr (mononucleosis infecciosa); roséola infantil por VHH6, VHH7; pustulosis exantemática aguda generalizada (PEAG); parvovirus B19 (eritema infeccioso); infección por adenovirus; cuadro febril, Sd. Gianotti-Crosti; eccema del pañal.

Centro Nacional de Epidemiología, Instituto de Salud Carlos III, Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica Plan estratégico para la eliminación del sarampión y la rubeola en España. https://www.sanidad.gob.es/areas/promocionPrevencion/vacunaciones/sarampion-rubeola/docs/PlanEstrategico_SarampionyRubeola.pdf

XVI JORNADAS DE
INMUNIZACIONES
GIJÓN, 21 Y 22 DE MARZO DE 2025
vacunasaeop.org

CLASIFICACIÓN DE LOS CASOS SOSPECHOSOS DE SARAMPIÓN

Tabla 1. Casos acumulados desde el 01/01/2025 hasta el 09/03/2025 (Semana 10 de 2025)

CC.AA	Casos notificados	En Investigación	Clasificación de origen de la infección					Casos descartados				
	Total	Total	Endémico	Importado	Relacionado importación	Desconocido/en investigación	Total	Rubéola	Casos Vacunales	Otro Diagnóstico	Sin Diagnóstico	Total
Andalucía	55			13	2	25	40			1	14	15
Aragón	4	1		2	1		3					0
Asturias	1			1			1					0
Baleares	2			2			2					0
Canarias							0					0
Cantabria							0					0
Castilla-La Mancha	9			2	7		9					0
Castilla y León							0					0
Cataluña	17			7		10	17					0
C. Valenciana	6	1		2	1		3				2	2
Extremadura							0					0
Galicia	2						0				2	2
Madrid	2				1		1				1	1
Murcia	1			1			1					0
Navarra	1			1			1					0
País Vasco	137			1	45		46		4	5	82	91
La Rioja							0					0
Ceuta	6			6			6					0
Melilla	15			6		6	12				3	3
Total	258	2	0	44	57	41	142	0	4	6	104	114

Otros diagnósticos (diferentes de Rubéola) Sd. Kawasaki, infección por estreptococo A (escarlatina); enfermedad mano-pie-boca, probable reacción alérgica; virus de Epstein-Barr (mononucleosis infecciosa); roséola infantil por VHH6, VHH7; pustulosis exantemática aguda generalizada (PEAG); parvovirus B19 (eritema infeccioso); infección por adenovirus; cuadro febril, Sd. Gianotti-Crosti; eccema del pañal.

Centro Nacional de Epidemiología, Instituto de Salud Carlos III, Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica Plan estratégico para la eliminación del sarampión y la rubeola en España. https://www.sanidad.gob.es/areas/promocionPrevencion/vacunaciones/sarampion-rubeola/docs/PlanEstrategico_SarampionyRubeola.pdf

A photograph of a baby being held by a person, overlaid with a blue filter. The baby is looking towards the camera. The text 'SARAMPION' is written in white, bold, uppercase letters across the center of the image.

SARAMPION

¿Por qué este aumento de casos ?

A blue-tinted photograph of a baby being held by a person. The baby is looking towards the camera. The text is overlaid in white on the image.

La Infección más contagiosa

Las coberturas vacunales

Pérdida de la inmunidad

Global Measles Vaccination

“ Measles anywhere is a threat everywhere “

El sarampión puede **cruzar fácilmente las fronteras** y causar brotes en cualquier comunidad donde las **personas no estén vacunadas** o estén **insuficientemente vacunadas** (omitiendo una o ambas dosis de la vacuna contra el sarampión).

<https://www.cdc.gov/global-measles-vaccination/data-research/global-measles-outbreaks/>

XVI JORNADAS DE INMUNIZACIONES | **aep** **aepCAV**
GIJÓN, 21 Y 22 DE MARZO DE 2025
vacunasaep.org

R₀

Transmissibility

Basic reproduction number (R₀):

Enfermedad	R ₀
Sarampión	12-18
Tos ferina	12-17
Difteria	6-7
Viruela	5-7
Polio	5-7
Rubéola	5-7
Paperas	4-7
VIH/SIDA	2-5
SARS	2-5
Influenza pandemia de 1918	2-3
Ébola	2-3

10 countries accounted for 55% of children without a measles vaccine. 3 of these are also among 10 countries with lowest MCV1 coverage.

The countries with most “measles zero dose” children is a mix of those with large birth cohorts, weak health systems, or both. New in this list in 2023 are countries afflicted by conflict, like Sudan, Yemen, and Afghanistan.

Additionally, some smaller countries have even lower coverage.

No measles vaccine

Countries with lowest MCV1 coverage

Coverage according to legend, circles sized to numbers of vaccinated and unvaccinated children.

Measles coverage in countries with large or disruptive measles outbreaks since 2019 is too low to control further outbreaks

The 91 countries not experiencing measles outbreaks in the last 5 years achieve consistently higher measles vaccine coverage than the 103 countries that did experience outbreaks. Even in these countries there is a concerning recent decline.

The 103 countries experiencing outbreaks are on average achieving 10 percentage points lower coverage for a first dose of measles vaccine. These represent 75% of the global birth cohort.

Sustained and consistent improvements in routine immunisation over time are effective at curtailing measles transmission, when combined with SIAs.

No outbreaks in the last 5 years (N=91)

Outbreaks in the last 5 years (N=103)

● MCV1 ● MCV2

XVI JORNADAS DE INMUNIZACIONES **aep** **aepCAV**
 GIJÓN, 21 Y 22 DE MARZO DE 2025
 vacunasaep.org

EE.UU. reporta dos muertos por brote de sarampión

08/03/2025

Las autoridades sanitarias informaron que los casos de la enfermedad siguen en aumento en Texas y en Nuevo México.

Vacunación la mejor protección

La vacuna contra el sarampión, obligatoria para niños de 12 meses en adelante, confiere una inmunidad de por vida del **93% con una dosis, que aumenta al 97% después de la segunda.**

Pero, las tasas de inmunización han disminuido en el país. Los CDC recomiendan una tasa de vacunación del 95% para la inmunidad colectiva, pero la cobertura nacional entre los niños de preescolar cayó al **92,7%** en 2023-2024.

El actual **secretario de Salud**, Robert F. Kennedy Jr., pasó décadas **criticando la vacuna MMR, que vinculó con el autismo**, afirmación desacreditada por la investigación científica. Actualmente (brotes) ha suavizado su postura, recomendando la vacunación aunque fomenta tratamientos como la vitamina A y los esteroides.

XVI JORNADAS DE INMUNIZACIONES | **aep** **aepCAV**
GIJÓN, 21 Y 22 DE MARZO DE 2025
vacunasaep.org

Vacuna/antígeno: TRIPLE VÍRICA

Dosis: Dosis 1

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Cobertura %						
Total España	97,74 %	97,88 %	97,53 %	96,29 %	95,57 %	97,24 %	97,83 %

Dosis: Dosis 2

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Cobertura %						
Total España	93,14 %	94,45 %	94,26 %	93,93 %	91,91 %	93,92 %	94,42 %

XVI JORNADAS DE INMUNIZACIONES
 GIJÓN, 21 Y 22 DE MARZO DE 2025
 aep aepCAV
 vacunasaep.org

* Las **coberturas vacunales** fueron variables (en el tiempo y según CC. AA.) a partir de 1981. Globalmente, en 1985 80 % y en 1993 >90 %

1999
Se adelanta la **segunda dosis de triple vírica a los 3-6 años**

2012
Triple vírica: **primera dosis a los 12 meses y segunda a los 3-4 años**

2022
Primera dosis de **triple vírica a los 11 meses administrada en circunstancias especiales: válida a efectos de calendario**

9-24 m

9 m

15 m

1988-1996

1999

2012

2024

1988-1996
Se añade la **segunda dosis de triple vírica a niños y niñas a los 11 años** (sustituyendo a la de rubeola de niñas) (implantación variable según CC. AA.)

1981
Vacuna triple vírica a los 15 meses* (sustituyendo a la monocomponente de los 9 meses)

15m 3-6 años

12m 3-4 años

Sarampión

Triple vírica

2º dosis ¿Tetravírica ?

Dosis única

Dos dosis

2016

ESPAÑA LOGRA LA "ELIMINACIÓN" DEL SARAMPIÓN, SEGÚN LA OMS

29 septiembre 2017

Fuente: Oficina regional de la OMS para Europa.

Versión para imprimir | Share | Post

XVI JORNADAS DE INMUNIZACIONES | **aep** | **aepCAV**
GIJÓN, 21 Y 22 DE MARZO DE 2025
vacunasaep.org

Decreasing Seroprevalence of Measles Antibodies after Vaccination – Possible Gap in Measles Protection in Adults in the Czech Republic

PLOS ONE | DOI:10.1371/journal.pone.0170257 January 13, 2017

Jan Smetana^{1*}, Roman Chlibek^{1*}, Irena Hanovcova¹, Renata Sosovickova¹, Libuse Smetanova², Peter Gal³, Petr Dite^{1,4}

Fig 1. Prevalence of IgG antibodies against measles by age group.

Natural infection provides longer term protection than vaccination

Post vaccination immunity decreases in time

vaccination status

Fig 2. Prevalence of IgG antibodies against measles in group 40–49 years of age.

Unveiling immunity gaps and determining a suitable age for a third dose of the measles-containing vaccine: a strategic approach to accelerating measles elimination

Somya Mehra,^{a,h} Sajikapon Kludkleeb,^{b,h} Chutikam Chaimayo,^c Pomsawan Leaugwutiwong,^d Saranath Lawpoonsri,^e Wirichada Pan-ngum,^{a,e,j} Kulkanya Chokephaibulkit,^{f,g} and Thundon Ngamprasertchai^{e,*}

The Lancet Regional Health - Southeast Asia 2025;32: 100523

Published Online 21 December 2024
<https://doi.org/10.1016/j.lansea.2024.100523>

Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand

Resultados:

La prevalencia general de **seropositividad para sarampión fue del 65,6%** ([IC] del 95%: 61,5–69,6).

Las curvas predictivas para la seroprevalencia estratificada por edad mostraron una **tendencia decreciente entre los 13 y los 25 años**, con una tendencia al alza de 26 a 30 años.

Interpretación:

Nuestros hallazgos ponen de manifiesto una **brecha significativa en la inmunidad contra el sarampión en adultos jóvenes de 20 a 26 años**, lo que plantea un mayor riesgo de transmisión.

Un MCV3 a la edad de 18 a 20 años potencialmente cierra la brecha y ayuda al sarampión programas de eliminación.

Evaluación del impacto del 2º estudio de seroprevalencia en el programa de vacunación frente a sarampión

Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones 2024

Noviembre 2024

El 2º estudio de seroprevalencia mostró un descenso del porcentaje de población con anticuerpos frente a sarampión a **partir del grupo de 10-14 años** y hasta el **grupo de 30-39 años** (cohortes nacidas entre 1978 y 2002).

Este descenso es más pronunciado en el **grupo 20-29 años** (cohortes nacidas entre 1988 y 1997), que puede deberse al **descenso en el nivel de inmunidad humoral (waning)** por la escasa o nula circulación del virus salvaje a medida que pasa el tiempo desde la vacunación con 2º dosis de TV.

[@CAV_AEP. Diciembre 2024](https://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-37)

XVI JORNADAS DE INMUNIZACIONES
GIJÓN, 21 Y 22 DE MARZO DE 2025
vacunasaep.org

Gráfica 4. Proporción de individuos con anticuerpos frente a sarampión y título, por grupo de edad/cohorte de nacimiento

*MGT: Media geométrica del título de anticuerpos

[@CAV_AEP. Diciembre 2024](https://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-37)

XVI JORNADAS DE INMUNIZACIONES
 GIJÓN, 21 Y 22 DE MARZO DE 2025
 vacunasaep.org

RECOMENDACIONES

¿ Hace falta una 3^a dosis ?

¿ Hay que adelantar la 2^a dosis ?

¿ Se puede adelantar la 1^a dosis ?

Unveiling immunity gaps and determining a suitable age for a third dose of the measles-containing vaccine: a strategic approach to accelerating measles elimination

Somya Mehra,^{a,h} Sajikapon Kludkleeb,^{b,h} Chutikam Chaimayo,^c Pomsawan Leangwutiwong,^d Saranath Lawpoolsri,^e Wirichada Pan-ngum,^{a,e,j} Kulkanya Chokephaibulkit,^{f,g} and Thundon Ngamprasertchai^{e,*} Mahidol University, Bangkok, Thailand

The Lancet Regional Health - Southeast Asia 2025;32: 100523

Published Online 21 December 2024
<https://doi.org/10.1016/j.lansea.2024.100523>

Interpretación:

Nuestros hallazgos ponen de manifiesto una **brecha significativa en la inmunidad contra el sarampión en adultos jóvenes de 20 a 26 años**, lo que plantea un mayor riesgo de transmisión.

Un MCV3 a la edad de 18 a 20 años potencialmente cerraría la brecha y ayudaría en los programas de eliminación.

Evaluación del impacto del 2º estudio de seroprevalencia en el programa de vacunación frente a sarampión

Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones 2024

Noviembre 2024

1

1. **No se considera necesario modificar el programa de vacunación frente al sarampión** en el calendario común de vacunación a lo largo de toda la vida.
2. **No se recomienda el uso de una tercera dosis de vacuna triple vírica** en personal sanitario con dos dosis documentadas, independientemente del tiempo que haya transcurrido tras la segunda dosis por cuanto el beneficio de la aplicación sistemática es pequeño.
3. **No se recomienda realizar serología frente al sarampión de manera sistemática** en población general ni en personal del entorno sanitario en tanto que la interpretación de los resultados de IgG es escasa para establecer el umbral de protección
4. Es necesario **insistir en que toda la población esté adecuadamente protegida frente al sarampión con dos dosis de vacuna** siempre que no hayan padecido el sarampión.
5. Es necesario **extremar la vigilancia epidemiológica** en caso de brotes en un entorno sanitario y se considerará todos los contactos como susceptibles
6. Para las **personas nacidas fuera de España**, puesto que el calendario que hayan seguido puede ser diferente al de nuestro país, no se tendrá en cuenta el año de nacimiento y solo se considerará población no susceptible si se aporta documentación de vacunación previa correcta.
7. En el caso de la población infantil a la que se le haya administrado la **primera dosis antes del año de edad, no se considerara vacunada***. Se recomienda administrar dos dosis de vacuna frente al sarampión si no las tienen documentadas.

[@CAV_AEP. Diciembre 2024](https://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-37)

Adelanto 2ª dosis TV y varicela

3 -4 años

2 años

VACUNA O ANTICUERPO MONOCLONAL	Embarazadas	Niños (edad en meses)						Niños y adolescentes (edad en años)							
		0	2	4	6	11	12	15	2	4	6	10	12	14	15-18
Tdpa		HB DTPa VPI	HB DTPa VPI		HB DTPa VPI				DTPa/ Tdpa VPI	Tdpa				
<i>Haemophilus influenzae</i> tipo b ⁴			Hib	Hib		Hib									
Neumococo ⁵		TETRAVÍRICA A LOS 2 AÑOS													
Rotavirus ⁶															
Meningococo B ⁷			MenB	MenB				MenB					MenB		
Meningococos ACWY ⁸				Men ACWY				Men ACWY					Men ACWY		
Gripe ⁹	Gripe				Gripe										
SARS-CoV-2 ¹⁰	SARS-CoV-2														
Sarampión, rubeola y parotiditis ¹¹							SRP			SRP-Var					
Varicela ¹²								Var		SRPV					
Virus del papiloma humano ¹³												VPH			
Virus respiratorio sincitial ¹⁴	VRS														

Recomendado

<https://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-37> /// <https://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-41>

Posibilidades de adelantar 1ª dosis TV

<https://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-37>

Revising US MMR Vaccine Recommendations Amid Changing Domestic Risks

Benjamin Rader, PhD, MPH^{1,2}; Rochelle P. Walensky, MD, MPH^{3,4}; Wesley S. Rogers, MD⁵; et al JAMA. Published online March 14, 2025. doi:10.1001/jama.2025.3867

- Los brotes recientes de sarampión en los EE. UU. y en todo el mundo requieren un **examen cuidadoso de las recomendaciones de vacunación contra el sarampión**, las paperas y la rubéola (MMR) de los EE. UU.
- Actualmente, el ACIP recomienda **2 dosis de por vida de la vacuna MMR** para la mayoría de las personas, la 1ª entre los 12 y los 15 meses de edad y la 2ª entre los 4 y los 6 años. Se indica la administración de una **tercera dosis**, durante un brote de sarampión y en grupos de alto riesgo (p. ej., trabajadores de la salud y personas inmunodeprimidas).
- Para los niños de **6 a 11 meses de edad que van a viajar internacionalmente**, se recomienda una dosis temprana adicional de la vacuna MMR antes de viajar, antes de comenzar la serie 2 dosis a los 12 meses de edad.
- La importación de enfermedades de niños no vacunados que viajan internacionalmente a regiones endémicas ha sido la principal fuente de casos de sarampión en los Estados Unidos. **Sin embargo, los múltiples brotes recientes de sarampión en Estados Unidos, junto con las bajas tasas de vacunación, señalan un peligro doméstico creciente.**

Department of Pediatrics, Harvard Medical School, Boston, Massachusetts

A photograph of a baby being held by two people, overlaid with a blue filter. The baby is in the center, looking towards the camera. The hands of the people holding the baby are visible around the baby's body. The word "CONCLUSIONES" is written in white, bold, uppercase letters across the middle of the image.

CONCLUSIONES

**Take home message*

A tener en cuenta...

- ✓ Alcanzar y mantener unas **coberturas de vacunación por encima del 95% con dos dosis.**
- ✓ Identificar los **factores que contribuyen a la no aceptación de las vacunas**
- ✓ Valorar si son necesarias modificaciones en las pautas de vacunación **¿ Adelantar 2ª dosis ? ¿ 3ª dosis ?**
- ✓ Elaborar **mapas de riesgo de sarampión** para identificar grupos de personas o territorios con mayor susceptibilidad y orientar las actuaciones en ellos.
- ✓ **Identificar precozmente los casos sospechosos de sarampión** mediante el reconocimiento inicial de **síntomas** y estudiar la **dinámica de la transmisión** del virus en personas con vacunación completa.
- ✓ Toma de muestras de **sangre, orina y exudado faríngeo** y seguir los algoritmos de diagnóstico.
- ✓ Es fundamental el **estudio genómico** de los casos de sarampión ara verificar la eliminación del sarampión en nuestro territorio.

Es una enfermedad **muy contagiosa**, con posibles **complicaciones graves**, para la que hay **una vacuna muy segura**

- Es una infección causada por virus **sin tratamiento específico**

- Hace años era frecuente en nuestro medio; aún lo es en muchos países

- **Incidencia creciente en España y países cercanos**

Síntomas del sarampión

- Fiebre, tos, congestión nasal, irritación ocular y una erupción cutánea (y dentro de la boca aparecen unas manchitas muy características)
- La erupción aparece días después de la fiebre, comienza en la cara y se extiende después por todo el cuerpo

Sarampión

Complicaciones

- Otitis, neumonía, diarrea, inflamación del cerebro
- Secuelas definitivas: sordera
- 1-2 de cada mil niños con sarampión pueden morir por el sarampión o sus complicaciones

Vacuna del sarampión

- **Vacuna SRP (triple vírica)**: sarampión, rubeola y parotiditis (también disponible la cuádruple vírica, con varicela añadida)
- **Vacuna muy segura y muy efectiva**
- **Incluida en el calendario** de todas las comunidades españolas: 1.ª dosis a los 12 meses y 2.ª a los 3-4 años de edad
- **Vacunación completa a cualquier edad (>12 meses de edad)**: dos dosis, con un intervalo mínimo de un mes entre ambas
- **Muy pocas contraindicaciones**: por ej. el embarazo e inmunosupresión)
- Si no tiene seguridad de haber recibido las dos dosis, siempre es mejor y más seguro, vacunar

Si va a emprender un viaje a una zona con elevada transmisión

- El sarampión es endémico en numerosos países, incluidos algunos de nuestro entorno
- **Antes del viaje**: compruebe que tiene las 2 dosis, al menos un mes antes del viaje (¡importante en niños, adolescentes, jóvenes y adultos nacidos desde 1978!)
- Lactantes de 6 a 11 meses de edad: valorar la necesidad de una dosis de la vacuna si no hay contraindicación (y después 1 o 2 dosis del calendario)
- **Después del viaje**: si tiene síntomas sospechosos (fiebre y erupción cutánea), consulte a su médico

Sarampión [info familias] v.3 / 2024

@CAV_AEP ● Más información: las vacunas, una a una: <https://vacunasaep.org/familias/vacunas-una-a-una>