

20 de enero de 2014

Este calendario de vacunaciones, diseñado para la infancia y la adolescencia, indica las edades en las que se han de administrar las vacunas consideradas por el CAV-AEP con perfil de sistemáticas, de recomendadas y aquellas para situaciones de riesgo.

En caso de no llevarse a cabo la vacunación en las edades establecidas, deben aplicarse las recomendaciones de vacunación con la pauta acelerada o de rescate. Se recomienda consultar el calendario de vacunación de la propia comunidad o ciudad autónoma. Las reacciones adversas se deben notificar a las autoridades sanitarias.

| CALENDARIO DE VACUNACIONES DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA 2014<br>Comité Asesor de Vacunas |               |            |      |            |       |       |              |             |       |
|--|---------------|------------|------|------------|-------|-------|--------------|-------------|-------|
| VACUNA   | Edad en meses |            |      |            |       |       | Edad en años |             |       |
|  | 0             | 2          | 4    | 6          | 12-15 | 15-18 | 2-3          | 4-6         | 11-12 |
| Hepatitis B <sup>1</sup>   | HB            | HB         | HB   | HB         |       |       |              |             |       |
| Difteria, tétanos y tosferina <sup>2</sup>   |               | DTPa       | DTPa | DTPa       |       | DTPa  |              | DTPa o Tdpa | Tdpa  |
| <i>Haemophilus influenzae</i> tipo b <sup>3</sup>  |               | Hib        | Hib  | Hib        |       | Hib   |              |             |       |
| Poliomielitis <sup>4</sup>   |               | VPI        | VPI  | VPI        |       | VPI   |              |             |       |
| Meningococo C <sup>5</sup>   |               | MenC       |      |            | MenC  |       |              |             | MenC  |
| Neumococo <sup>6</sup>   |               | VNC        | VNC  | VNC        | VNC   |       |              |             |       |
| Sarampión, rubeola y parotiditis <sup>7</sup>  |               |            |      |            | SRP   |       | SRP          |             |       |
| Virus del papiloma humano <sup>8</sup>   |               |            |      |            |       |       |              |             | VPH   |
| Rotavirus <sup>9</sup>   |               | RV 3 dosis |      |            |       |       |              |             |       |
| Varicela <sup>10</sup>   |               |            |      |            | Var   |       | Var          |             |       |
| Gripe <sup>11</sup>  |               |            |      | Gripe      |       |       |              |             |       |
| Hepatitis A <sup>12</sup>  |               |            |      | HA 2 dosis |       |       |              |             |       |

Sistemática

Recomendada

Grupos de riesgo

**(1) Vacuna antihepatitis B (HB).**- 3 dosis según 3 pautas equivalentes: 0, 1, 6 meses o 0, 2, 6 meses o 2, 4, 6 meses, todas adecuadas para hijos de madres seronegativas (HBsAg neg.), siendo las 2 primeras pautas también adecuadas para hijos de madres portadoras del virus de la hepatitis B (HBsAg +). Estos últimos recién nacidos (madres HBsAg +) recibirán en las primeras 12 horas de vida la 1.<sup>a</sup> dosis de vacuna y 0,5 ml de inmunoglobulina antihepatitis B, la 2.<sup>a</sup> dosis de vacuna a la edad de 1 o 2 meses y la 3.<sup>a</sup> dosis a los 6 meses de vida. Si la serología materna fuera desconocida deberá administrarse la 1.<sup>a</sup> dosis de vacuna en las primeras 12 horas de vida e investigar la serología inmediatamente y, si resultara positiva, administrar 0,5 ml de inmunoglobulina antihepatitis B en la 1.<sup>a</sup> semana de vida (preferentemente en las primeras 72 horas de vida). La administración de 4 dosis de vacuna HB es aceptable en niños vacunados de la 1.<sup>a</sup> dosis monocomponente al nacer, seguida de 3 dosis de vacuna hexavalente a los 2, 4 y 6 meses de edad. Los niños y adolescentes no vacunados recibirán a cualquier edad 3 dosis según la pauta 0, 1, 6 meses.

**(2) Vacuna frente a la difteria, el tétanos y la tosferina acelular (DTPa/Tdpa).**- 6 dosis: primovacunación con 3 dosis de vacuna DTPa; refuerzo a los 15-18 meses (4.<sup>a</sup> dosis) con DTPa; a los 4-6 años (5.<sup>a</sup> dosis) con DTPa o con el preparado de baja carga antigénica de difteria y tosferina (Tdpa) y a los 11-12 años (6.<sup>a</sup> dosis) con Tdpa.

**(3) Vacuna conjugada frente al *Haemophilus influenzae* tipo b (Hib).**- 4 dosis: primovacunación a los 2, 4, 6 meses y refuerzo a los 15-18 meses (4.<sup>a</sup> dosis).

**(4) Vacuna antipoliomielítica inactivada (VPI).**- 4 dosis: primovacunación con 3 dosis y refuerzo a los 15-18 meses (4.<sup>a</sup> dosis).

**(5) Vacuna conjugada frente al meningococo C (MenC).**- 3 o 4 dosis de vacuna conjugada monovalente (esquema 1 o 2 + 1 + 1), con la siguiente pauta: 1 o 2 dosis entre los 2 y 11 meses de edad, otra dosis a los 12 meses de edad y otra dosis final a los 12 años. La pauta para los lactantes de 2 a 4 meses de edad, con 1 o 2 dosis, dependerá del preparado vacunal que se utilice.

**(6) Vacuna conjugada frente al neumococo (VNC).**- 4 dosis: las 3 primeras a los 2, 4, 6 meses con un refuerzo entre los 12 y 15 meses de edad (4.<sup>a</sup> dosis).

**(7) Vacuna frente al sarampión, la rubeola y la parotiditis (SRP).**- 2 dosis de vacuna sarampión-rubeola-parotiditis (triple vírica). La 1.<sup>a</sup> a los 12 meses, y la 2.<sup>a</sup> a los 2-3 años de edad, preferentemente a los 2 años.

**(8) Vacuna frente al virus del papiloma humano (VPH).**- Sólo para niñas. 2 o 3 dosis entre los 11 y los 12 años. Pauta de vacunación según el preparado vacunal. La tetravalente con pauta 0, 2, 6 meses y la bivalente con pauta de 2 dosis (0 y 6 meses) para niñas entre 9 y 14 años, y pauta de 3 dosis (0, 1, 6 meses) si 15 años o más.

**(9) Vacuna frente al rotavirus (RV).**- 3 dosis de vacuna frente al rotavirus: a los 2, 4, 6 meses o a los 2, 3, 4 meses. La pauta ha de iniciarse entre las 6 y las 12 semanas de vida y debe completarse antes de las 32 semanas de edad.

**(10) Vacuna frente a la varicela (Var).**- 2 dosis: la 1.<sup>a</sup> a los 12 meses (es aceptable a los 12-15 meses) y la 2.<sup>a</sup> a los 2-3 años de edad, preferentemente a los 2 años. En pacientes susceptibles fuera de las edades anteriores, vacunación con 2 dosis con un intervalo de, al menos, 1 mes.

**(11) Vacuna antigripal (Gripe).**- Vacunación anual de pacientes con factores de riesgo y sus convivientes (mayores de 6 meses). 1 dosis en mayores de 9 años; entre 6 meses y 9 años se administrarán 2 dosis la 1.<sup>a</sup> vez, con un intervalo de 1 mes y en los años siguientes, si persiste el factor de riesgo, vacunación anual con 1 dosis.

**(12) Vacuna antihepatitis A (HA).**- 2 dosis, con un intervalo de 6-12 meses, a partir de los 12 meses de edad. Vacunación de pacientes con indicación por viajes internacionales a países con endemicidad intermedia o alta, o por pertenecer a grupos de riesgo.