

# Vacunación específica en niños y adolescentes (<18 años) con condiciones de riesgo

(el contenido corresponde, salvo error involuntario, con la propuesta del **Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social**, Comisión de Salud Pública del CISNS, publicada el 20 de diciembre de 2019, y disponible en [http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/docs/CalendarioVacunacion\\_GRinfantil.pdf](http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/docs/CalendarioVacunacion_GRinfantil.pdf))

Vacunación	Condición de riesgo									
	Embarazo	Inmunodepresión (excepto VIH)	Infección por VIH		Asplenia, deficiencia complemento y tratamiento con eculizumab	Enfermedad renal crónica avanzada y hemodiálisis	Enfermedad cardiovascular y respiratoria crónicas	Enfermedad hepática crónica	Fístula de LCR Implante coclear	Prematuros*
			<15% o n.º CD4 <200/µl	≥15% o n.º CD4 ≥200/µl						
Difteria, tétanos y tosferina	dTpa <sup>(a)</sup>	DTPa, dTpa o Td si susceptible o vacunación incompleta <sup>(b)</sup>								
<i>Haemophilus influenzae b</i>			Hib	Hib						
Sarampión, rubeola y parotiditis	Contraindicada			TV si susceptible <sup>(c)</sup>						
Hepatitis B			HB <sup>(d)</sup>		HB <sup>(e)</sup>		HB			
Hepatitis A			HA				HA			
Enfermedad meningocócica			MenACWY	MenACWY, MenB						
Varicela	Contraindicada			VVZ si susceptible <sup>(f)</sup>						
VPH			VPH <sup>(g)</sup>							
Enfermedad neumocócica		VNC13 + VNP23	VNC13 + VNP23	VNC13 + VNP23	VNC13 + VNP23	VNP23	VNP23 <sup>(h)</sup>	VNC13 + VNP23		
Rotavirus										Rotavirus <sup>(i)</sup>
Gripe	Gripe	Gripe anual								Gripe anual <sup>(i)</sup>

**[a]** Se administrará la vacuna dTpa en cada embarazo, entre las semanas 27-36. **[b]** Vacunar si susceptible o vacunación incompleta. **[c]** Personas que no se hayan vacunado con anterioridad. Pauta de 2 dosis. **[d]** En caso de no responder a la primera pauta de vacunación, se administrará vacuna tipo adulto (pauta 0, 1 y 6 meses). **[e]** Se utilizará vacuna del alta carga antigénica (20 µg/0,5 ml) o específica para diálisis y prediálisis (si ≥15 años) en personas no vacunadas con anterioridad. Revisión serológica y revacunación cuando sea necesario. **[f]** Vacunar si no antecedentes de infección ni vacunación previa. **[g]** Tanto hombres como mujeres (3 dosis). **[h]** VNC13+VNP23 si cirrosis hepática. **[i]** Lactantes nacidos entre la semana 25-27 (según la vacuna utilizada) y 32 de gestación, clínicamente estables y sin contraindicaciones. Vacunación según la edad cronológica y siguiendo las pautas autorizadas para cada vacuna. **[j]** En prematuros de menos de 32 semanas de gestación, vacuna inactivada de gripe anual entre los 6 y 24 meses de edad. Administrar 2 dosis de 0,5 ml la primera vez que se vacune, con un intervalo mínimo de 4 semanas. Vacunaciones posteriores, 1 dosis.

\* Resto de vacunación en los prematuros según la edad cronológica siguiendo calendario de vacunación.

Recomendación específica por patología o condición • Recomendación general • Contraindicada • No recomendada (celda en blanco)