

Vacunación frente a la COVID-19, 2025-26

(adaptado de: Ministerio de Sanidad, septiembre de 2025)

<p>Observaciones generales / edad</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Solo en personas con condiciones de mayor riesgo o interés social especificados • Una sola dosis: <ul style="list-style-type: none"> – Independientemente del número de dosis previas – Al menos 3 meses después de una dosis o infección previas – Excepción: niños de 6-59 meses sin antecedentes de vacunación o infección previas, pauta de tres dosis de Comirnaty 3 mcg (0, 3 y 8 semanas). Si antecedente de vacunación con pauta completa o infección previa: una sola dosis • Con vacunas de ARNm adaptadas a ómicron, a ser posible actualizadas a la nueva variante LP.8.1 • Dosis adicional en personas ≥ 6 meses con inmunodepresión grave, al menos, 3 meses después de la última dosis o infección previa, excepto en casos que estén a punto de recibir o aumentar la intensidad de un tratamiento inmunosupresor, donde se podría reducir el intervalo a 3 semanas
<p>6 meses a 11 años</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Solo niños con condiciones asociadas a un aumento de riesgo de enfermedad grave y sus convivientes
<p>12 a 59 años</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Grupos de riesgo o inmunosupresión grave • Personas internas en instituciones cerradas, centros de discapacidad y residencias de mayores • Embarazadas, en cualquier trimestre de la gestación • Convivientes con personas con alto grado de inmunosupresión, personas de 70 años o más, o con factores de riesgo • Personal centros sanitarios y sociosanitarios de cualquier titularidad, como medida de protección personal
<p>≥ 70 años</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sí, con carácter general

Adaptado de: [Ministerio de Sanidad, septiembre de 2025](#)