

Vacunación de los lactantes frente al rotavirus



Aspectos prácticos. Fuentes: [fichas técnicas](#) de Rotarix y RotaTeq y [Manual de inmunizaciones](#) en línea de la AEP

		Rotarix (2 dosis de 1,5 ml, vía oral)	RotaTeq (3 dosis de 2 ml, vía oral)
Edad gestacional mínima al nacer		27 semanas	25 semanas
Intervalo mínimo entre dosis		4 semanas	4 semanas
Primera dosis (edad cronológica)	Edad mínima	6 semanas	6 semanas
	Edad máxima	<ul style="list-style-type: none"> Preferentemente antes de las 13 semanas (hasta las 12 semanas + 6 días) Obligatoriamente antes de las 20 semanas (hasta las 19 semanas + 6 días) 	<ul style="list-style-type: none"> 1.ª dosis: antes de las 13 semanas (hasta las 12 semanas + 6 días) 2.ª dosis: preferentemente hasta las 18 semanas (18 semanas + 6 días). Obligatoriamente antes de las 29 semanas (hasta las 28 semanas + 6 días)
Finalización de la pauta vacunal (edad cronológica)		<ul style="list-style-type: none"> Preferentemente antes de las 16 semanas Obligatoriamente antes de las 24 semanas (hasta las 23 semanas + 6 días) 	<ul style="list-style-type: none"> Preferentemente antes de las 23 semanas Obligatoriamente antes de las 33 semanas (hasta las 32 semanas + 6 días)

Conservar entre +2 y +8 °C
 Estable 72 horas entre +8 y +25 °C y 24 horas entre +25 y +37 °C

Conservar entre +2 y +8 °C
 Estable 36 horas entre +8 y +25 °C