

Vacunación antigripal y frente a la covid, 2023-24

(adaptado de: Ministerio de Sanidad, 12 de septiembre de 2023)

	Vacunación covid	Vacunación antigripal
Observaciones generales / edad	<ul style="list-style-type: none"> No con carácter general, solo personas y grupos de mayor riesgo e interés social especificados. Con vacunas de ARNm adaptadas a ómicron XBB.1.5. Independientemente del número de dosis previas. Al menos 3 meses después de una dosis o infección previas. Una sola dosis, excepto en: <ul style="list-style-type: none"> Niños de 6-59 meses sin antecedentes de vacunación o infección previas. Pauta: tres dosis de Comirnaty 3 mcg (0, 3 y 8 semanas) o dos dosis de Spikevax 25 mcg (0 y 4 semanas). Personas de ≥ 6 meses con inmunodepresión grave. Una dosis adicional, al menos, 3 meses después de la última dosis o infección previa, salvo necesidad impuesta por el tratamiento inmunosupresor. 	<ul style="list-style-type: none"> No con carácter general, solo personas y grupos de mayor riesgo e interés social especificados. Con vacunas inactivadas o atenuadas tetravalentes. Una sola dosis, excepto en niños de 6 meses a 8 años con factores de riesgo y no vacunados antes (en estos, pauta: dos dosis separadas por un mes). La vacuna de la gripe puede administrarse a personas con antecedentes de alergia al huevo con las precauciones habituales. En caso de antecedentes de alergia grave, debe llevarse a cabo en un centro con personal cualificado y con una observación de al menos 30 minutos tras la vacunación.
6 a 59 meses	<ul style="list-style-type: none"> Solo niños con inmunosupresión grave y demás grupos de riesgo. 	<ul style="list-style-type: none"> Sí, con carácter general.
5 a 59 años	<ul style="list-style-type: none"> Grupos de riesgo. Personas internas en instituciones cerradas, centros de discapacidad y residencias de mayores. Embarazadas. Convivientes de: personas con alto grado de inmunosupresión; de personas mayores de 60 años; o con factores de riesgo. Personal de servicios críticos y esenciales en la comunidad: centros sanitarios y sociosanitarios de cualquier titularidad; FF. CC. SS del Estado, FF. AA.; bomberos y servicios de protección civil. 	
		<ul style="list-style-type: none"> Niños y adolescentes de 5-18 años de edad que reciben AAS de forma crónica. Fumadores. Estudiantes en prácticas en centros sanitarios y sociosanitarios. Personas con exposición laboral directa a animales o a sus secreciones.
≥ 60 años	<ul style="list-style-type: none"> Sí, con carácter general, vacunación frente a la covid y antigripal. 	

Ver la [tabla en su versión completa](#), con notas, observaciones y fuentes

Adaptado de: [Ministerio de Sanidad, 12 de septiembre de 2023](#)