



VACUNACIÓN FRENTE A LA GRIPE ESTACIONAL EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA, 2019-2020

Recomendaciones del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (CAV-AEP)

Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría: Javier Álvarez Aldeán, Nuria García Sánchez, M.^a Luisa Navarro Gómez, Jesús Ruiz-Contreras, Francisco José Álvarez García, M.^a José Cilleruelo Ortega, María Garcés-Sánchez, Elisa Garrote Llanos, Ángel Hernández Merino, Antonio Iofrío de Arce, Manuel Merino Moína, Abián Montesdeoca Melián.

Referencia para citar este artículo: Comité Asesor de Vacunas de la AEP. Vacunación frente a la gripe estacional en la infancia y la adolescencia. Recomendaciones 2019-2020. AEP [Internet]. Octubre 2019 [Consultado dd/mmm/aaaa]. Disponible en:

https://vacunasaep.org/sites/vacunasaep.org/files/gripe_cav-aep_recomendaciones_2019-20_v.1.pdf

Publicado en Internet: 14/10/2019 (v.2, 17/10/2019).

RESUMEN DE LAS RECOMENDACIONES DEL CAV-AEP PARA LA CAMPAÑA ANTIGRIPAL 2019-2020

Con relación a la infancia y la adolescencia, el **CAV-AEP recomienda** la vacunación antigripal en:

- **Grupos de riesgo:** niños a partir de los 6 meses de edad y adolescentes en determinadas situaciones o con enfermedades de base que supongan un riesgo aumentado de padecer complicaciones de la gripe
- Personas a partir de los 6 meses **que convivan con pacientes de riesgo.**
- Miembros del **entorno familiar de lactantes menores de 6 meses de edad con factores de riesgo**, ya que estos no pueden recibir la vacuna antigripal.
- Todos los **profesionales sanitarios.**
- **Embarazadas**, tanto para su propia protección como para la de su futuro hijo

Se recomienda emplear, de forma preferente, las **vacunas antigripales tetravalentes**, tanto inactivadas para uso por vía intramuscular como atenuadas por vía intranasal (aunque no van a ser distribuidas esta temporada), con las indicaciones de sus fichas técnicas correspondientes. Si no estuvieran disponibles, se utilizarán preparados trivalentes. El CAV-AEP recomienda emplear en todos los casos la dosis completa de 0,5 ml a cualquier edad (siempre a partir de los 6 meses de vida).

El CAV-AEP considera que la **vacunación antigripal de los niños mayores de 6 meses no incluidos en grupos de riesgo** es una medida recomendable de forma individualizada, a valorar por la familia y el pediatra, ya que, aunque en menor medida que en los ancianos e individuos con los factores de riesgo antes mencionados, durante la infancia también pueden aparecer complicaciones asociadas a la gripe.