

Vacunas antimeningocócicas

Información para familias

Meningococos

El meningococo es una bacteria que causa infecciones graves: meningitis, sepsis (infección generalizada), etc.:

- La **infección meningocócica invasora** (EMI) tiene una mortalidad alrededor del 10 % y causa secuelas graves en un 20-30 % de los que sobreviven
- Se tratan con **antibióticos**, pero a veces evolucionan tan rápidamente que no da tiempo a atajar la infección
- Los niños pequeños son los más afectados. Los adolescentes suelen portar la bacteria en su garganta con más frecuencia

Vacunas

Hay varias familias de meningococos y cada una necesita una vacuna específica

Meningococos ACWY

Disponibles en farmacias con receta médica

¿A quién vacunar?

- Adolescentes a partir de los 14 años que vayan a residir en países donde se vacuna en calendario
- Niños a partir de las 6 semanas de edad si van a viajar a zonas de mayor incidencia
- 1 dosis desde el año; 2 más un refuerzo en los menores de 12 meses

Nimenrix
desde las 6 semanas

Menveo
desde los 2 años

Meningococo B

Financiada en algunos casos

¿A quién vacunar?

- Todos los niños y adolescentes
- Desde los 2 meses
- Número de dosis según edad

Bexsero
desde los 2 meses

Trumenba
desde los 10 años

Reacciones adversas

- Son vacunas muy seguras
- La mayoría causan solo dolor e irritación en la zona de inyección
- Pueden causar fiebre

Contraindicaciones

- Alergia grave a una dosis previa de la vacuna o a algún componente

Meningococo C

Incluida en los calendarios vacunales de todas las comunidades

¿A quién vacunar?

- Todos los niños y adolescentes
- A los 4 y 12 meses, y a los 12 años

¿Cómo se administran?

- Intramuscular
- En el muslo (menores de 1-2 años), y después en el hombro
- Pueden administrarse a la vez que la mayoría de las demás vacunas infantiles