

## CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

### VACUNACIÓN ESPECÍFICA EN MENORES Y ADOLESCENTES (<18 AÑOS) CON CONDICIONES DE RIESGO

Calendario recomendado año 2023

VACUNACIÓN	CONDICIÓN DE RIESGO									
	Embarazo	Inmunodepresión (excepto VIH)	Infección por VIH		Asplenia, deficiencias de complemento y tratamiento con eculizumab	Enfermedad renal crónica avanzada y hemodiálisis	Enfermedad cardiovascular y respiratoria crónicas	Enfermedad hepática crónica	Fistula de LCR. Implante coclear	Prematuros*
			<15% o n° CD4 <200/μl	≥15% o n° CD4 ≥200/μl						
Difteria, tétanos, tosferina	dTpa <sup>(8)</sup>	DTPa, dTpa o Td si susceptible o vacunación incompleta <sup>(9)</sup>								
<i>Haemophilus influenzae b</i>			Hib	Hib						
Sarampión, rubeola, parotiditis	Contraindicada		TV si susceptible <sup>(6)</sup>							
Hepatitis B			HB <sup>(4)</sup>		HB <sup>(6)</sup>			HB		
Hepatitis A			HA					HA		
Enfermedad meningocócica			MenACWY	MenACWY, MenB						
Varicela	Contraindicada		WZ si susceptible <sup>(1)</sup>							
Virus del Papiloma Humano			VPH <sup>(8)</sup>							
Enfermedad neumocócica		VNC13+VNP23	VNC13+VNP23	VNC13+VNP23	VNC13+VNP23	VNP23	VNP23 <sup>(10)</sup>	VNC13+VNP23		
Rotavirus										Rotavirus <sup>(1)</sup>
Gripe	gripe	gripe anual								gripe anual <sup>(1)</sup>

<sup>(8)</sup> Se administrará la vacuna dTpa en cada embarazo, a partir de la semana 27 de gestación, pero preferentemente en la semana 27 o 28.

<sup>(9)</sup> Vacunar si susceptible o vacunación incompleta.

<sup>(6)</sup> Personas que no se hayan vacunado con anterioridad. Pauta con 2 dosis.

<sup>(4)</sup> En caso de no responder a primera pauta de vacunación, se administrará vacuna tipo adulto (pauta 0, 1, 6 meses).

<sup>(6)</sup> Se utilizará vacuna de alta carga antigénica (20μg/0,5 ml) o específica para diálisis y prediálisis (si ≥15 años) en personas no vacunadas con anterioridad. Revisión serológica y revacunación cuando sea necesario.

<sup>(8)</sup> Vacunar si no antecedentes de infección ni vacunación previa.

<sup>(8)</sup> Tanto hombres como mujeres (3 dosis).

<sup>(10)</sup> VNC13+VNP23 si cirrosis hepática.

<sup>(1)</sup> Lactantes nacidos entre las semanas 25-27 (según vacuna utilizada) y 32 de gestación, clínicamente estables y sin contraindicaciones. Vacunación según edad cronológica y siguiendo pautas autorizadas para cada vacuna.

<sup>(1)</sup> En prematuros de menos de 32 semanas de gestación, vacuna inactivada de gripe anual entre los 6 y los 24 meses de edad. Administrar 2 dosis 0,5 ml la primera vez que se vacune, con intervalo mínimo de 4 semanas. Vacunaciones posteriores, 1 dosis.

\*Resto de vacunación en prematuros se realizará según la edad cronológica siguiendo calendario de vacunación.

Recomendación específica por patología o condición

Contraindicada

Recomendación general

No recomendada