

# Inmunización frente al VRS con nirsevimab

## Temporada 2024-25



### Lactantes sanos

#### Pauta

- 0-5 meses: una dosis al inicio o durante la temporada VRS
- ≥6 meses: no indicado

### Riesgo de enfermedad grave por VRS

#### Prematuros de <35 semanas de gestación

#### Pauta

- 0-11 meses: una dosis al inicio o durante la temporada VRS, lo antes posible
- ≥12 meses: no indicado
- Si recibieron una dosis en la temporada 23-24: pueden recibir nueva dosis al inicio temporada 24-25 si aún no han cumplido 12 meses

### Riesgo de enfermedad grave por VRS

- Cardiopatía congénita (repercusión hemodinámica)
- Displasia broncopulmonar
- Cirugía cardíaca con bypass cardiopulmonar
- Inmunodepresión grave:
  - Enfermedades oncohematológicas
  - Inmunodeficiencias primarias
  - Tratamiento continuado con inmunosupresores
- Errores congénitos del metabolismo
- Enfermedades neuromusculares o pulmonares graves; fibrosis quística. Pacientes en cuidados paliativos
- Síndromes genéticos con problemas respiratorios; síndrome de Down

#### Pauta

- Una dosis al inicio de cada temporada y antes de cumplir 24 meses
- Si recibieron una dosis en la temporada 23-24: pueden recibir una nueva dosis si aún no han cumplido 24 meses
- Si tienen una edad entre 12 y 23 meses deben recibir 200 mg (2 x 100 mg en el mismo acto)
- Si no han recibido ninguna dosis previa, pero tienen una edad entre 12 y 23 meses: deben recibir 200 mg



- ▶ Compatible con las demás vacunas infantiles
- ▶ Se recomienda la inmunización en los lactantes independientemente del antecedente de vacunación materna frente al VRS durante el embarazo

### Beyfortus (Sanofi)

#### Presentaciones

- Jeringa precargada
- 50 mg en 0,5 ml
- 100 mg en 1 ml

#### Dosis

- <5 kg de peso: 50 mg
- ≥ 5 kg de peso: 100 mg



#### Más información

- Ministerio de Sanidad [\[ver\]](#)
- CAV-AEP: <https://vacunasaep.org/>