

Inmunización frente al VRS con nirsevimab

Temporada 2023-24

Lactantes sanos

Pauta

- 0-5 meses: una dosis al inicio o durante la temporada VRS
- ≥6 meses: no indicado

Riesgo de enfermedad grave por VRS

Prematuros de <35 semanas de gestación

Pauta

- 0-11 meses: una dosis al inicio o durante la temporada VRS, cuanto antes sea posible
- ≥12 meses: no indicado

Riesgo de enfermedad grave por VRS

Otras patologías

- Cardiopatía congénita con repercusión hemodinámica
- Displasia broncopulmonar
- Inmunodepresión grave:
 - Enfermedades oncohematológicas
 - Inmunodeficiencias primarias
 - Tratamiento continuado con inmunosupresores
- Errores congénitos del metabolismo
- Enfermedades neuromusculares o pulmonares graves
- Síndromes genéticos con problemas respiratorios; síndrome de Down
- Fibrosis quística
- Pacientes en cuidados paliativos

Pauta

- Una dosis en cada temporada de VRS hasta los 24 meses (1.ª dosis al inicio o durante la temporada, cuanto antes sea posible)



Beyfortus (Sanofi)

Presentaciones

- Jeringa precargada
- 50 mg en 0,5 ml
- 100 mg en 1 ml

Dosis

- <5 kg de peso: 50 mg
- ≥ 5 kg de peso: 100 mg

► Compatible con las demás vacunas infantiles

Más información

- Ministerio de Sanidad [\[ver\]](#)
- ANDAVAC, #StopBronquiolitis [\[ver\]](#)
- CAV-AEP: <https://vacunasaep.org/>

CAV-AEP, v.1, ago/2023 • @CAV_AEP

