

Vacunació contra el virus del papil·loma humà (VPH): recomanacions d'ús de la nova vacuna VPH9

Actualment, la vacunació contra el VPH a les noies a sisè de primària com a mesura per prevenir el càncer de cèrvix està inclosa en el vigent calendari de vacunacions sistemàtiques a Catalunya (Decret 95/2014, d'1 de juliol, pel qual s'estableix el calendari de vacunacions sistemàtiques, modificat per l'Ordre SLT/175/2016, de 20 de juny).

Des de la inclusió en el calendari de la vacunació contra el VPH a Catalunya l'octubre de 2007 (nenes nascudes a partir de 1997), s'ha disposat de dues vacunes: una de tetravalent (VPH4), Gardasil®, i una de bivalent (VPH2), Cervarix®. De les dues vacunes disponibles, la més utilitzada a Catalunya ha estat la vacuna tetravalent.

Per a aquest curs 2017-2018, com a novetat, s'utilitzarà la vacuna contra el virus del papil·loma humà nonavalent (VPH9), Gardasil 9. Aquesta vacuna incorpora beneficis respecte a les utilitzades fins ara, ja que inclou protecció contra cinc tipus addicionals de papil·lomavirus, cosa que permetrà augmentar la protecció contra més tipus de papil·lomavirus causants de càncers.

Per aquest motiu, a partir del mes de novembre de 2017, els centres vacunals disposaran de la vacuna VPH9 per a les indicacions de vacunació segons les recomanacions del Departament de Salut:

- ✓ Vacunació a les noies a sisè de primària.
- ✓ Dones conitzades per neoplàsia intraepitelial cervical moderada o de grau més avançat (NIC II+) o adenocarcinoma endocervical in situ (AIS), intervingudes en el darrer any.
- ✓ Dones amb el VIH fins als 26 anys.

Es recomana finalitzar les pautes iniciades amb la mateixa vacuna. Tot i això, dins del marc de transició dels diferents productes, i per tal facilitar la utilització de la vacuna VPH9, es podran finalitzar les pautes iniciades amb la vacuna VPH2 o VPH4 amb la vacuna VPH9 (dosis restants per finalitzar la pauta correctament; vegeu-ne el quadre adjunt).



Cal tenir en compte que la vacunació amb una pauta mixta garanteix la immunització dels serotips comuns inclosos en les vacunes utilitzades, i pot oferir una protecció parcial contra els serotips addicionals.

Cal recordar que l'interval per a la vacuna VPH9 segons l'inici de pauta és:

- De 9 a 14 anys (inclosos): **2 dosis separades per un mínim de 5 mesos.**
- Més de 14 anys: 3 dosis (0, 2 i 6 mesos). La segona dosi s'ha d'administrar almenys 1 mes després de la primera dosi i la tercera dosi, almenys tres mesos després de la segona dosi.

Dosis prèvies vàlides	Edat	Dosi de VPH9 que cal administrar (Interval mínim)
1 VPH4	≤13 anys	1 (6 mesos)
1 VPH2	≤14 anys	1 (6 mesos)
1 VPH4	>13 anys	2 (1 mes, 6 mesos)
1 VPH2	>14 anys	2 (1 mes, 6 mesos)
2 VPH4	>13 anys	1 (6 mesos)
2 VPH2	>14 anys	1 (6 mesos)

Pautes per completar les vacunacions iniciades amb la vacuna VPH2 o VPH4, si cal finalitzar-les amb la vacuna VPH9.

**Programa de vacunacions
Barcelona, 7 de novembre de 2017**