

# Vacunaciones de los lactantes prematuros

Manual de inmunizaciones en línea de la AEP, actualización de junio de 2023

- 1** Los **recién nacidos prematuros** (RNP) son **especialmente vulnerables a algunas infecciones**.
- 2** **Inmunogenicidad, reactogenicidad y seguridad** de las vacunas en los RNP: en general, aunque con particularidades y cierta variabilidad, son similares a las de los nacidos a término.
- 3** El **calendario vacunal a aplicar es el establecido con carácter general para todos los niños**, y debe comenzar a los 2 meses de edad, la misma edad establecida con carácter general, independientemente de la edad gestacional y peso al nacer.
- 4** Es muy importante **no demorar las vacunaciones sin justificación**, sobre todo las de los 2 y 4 meses de edad.
- 5** **Estar aún hospitalizado no justifica, en general, la demora** si el lactante está razonablemente estable clínicamente (aunque exige ciertas precauciones especiales, como por ej. con la vacuna del rotavirus).
- 6** Las **vacunaciones del primer año incluyen**: hexavalente y neumococo (a los 2, 4 y 11 meses), meningococo B (2 y 4 meses), meningococo C (4 meses), rotavirus (a partir de los 2 meses), gripe (a partir de los 6 meses).
- 7** **En el segundo año**: primeras dosis de sarampión, rubeola y parotiditis, y varicela. También un refuerzo de meningococo B y C/ACWY.
- 8** **Después seguir con el calendario vacunal estándar**: las siguientes vacunaciones, a los 3-4 años (las segundas dosis de sarampión, rubeola, parotiditis, y varicela).