

Rabia: profilaxis posexposición (PPE)

Tipo de exposición al virus (evaluación previa por Salud Pública)

Categoría I

- Tocar o alimentar al animal

Lavar las superficies expuestas con agua y jabón

No es necesaria profilaxis

Categoría II

- Mordisco en piel descubierta
- Rasguño o abrasión sin sangrado o contacto con saliva

Lavar minuciosamente la zona expuesta 10-15 min. con agua y jabón con/sin antiséptico

No vacunación previa (sin profilaxis preexposición, PPrE)

Vacunado (PPrE) (en caso de duda, tratar como no vacunado)

Categoría III

- Mordedura o rasguño transdérmico único o múltiple
- Contaminación de mucosas o piel lesionada con saliva del animal

Lavar minuciosamente la zona expuesta 10-15 min. con agua y jabón con/sin antiséptico

No vacunación previa (sin profilaxis preexposición, PPrE)

Personas inmunocompetentes

- Pauta vacunación: 4 dosis IM (0, 3, 7 y 14-28 días). Alternativa: dos dosis el día 0 y una los días 7 y 14-28
- Ig antirrábica no indicada

Personas con inmunodepresión

- Pauta vacunación: 5 dosis IM (0, 3, 7, 14 y 21-28 días)
- Ig antirrábica si ≤ 7 días desde la primera dosis de vacuna
- Control serológico 2-4 semanas después de la dosis 5. En caso de título de anticuerpos $< 0,5$ UI/ml, administrar una dosis adicional, y después nuevo control serológico

Personas inmunocompetentes

- Pauta vacunación: 2 dosis IM (0 y 3 días)
- Ig antirrábica no indicada

Personas con inmunodepresión

- Pauta vacunación: 4 dosis IM (0, 3, 7 y 14-28 días)
- Ig antirrábica si ≤ 7 días desde la primera dosis de vacuna
- Control serológico 2-4 semanas después de la dosis 4. En caso de título de anticuerpos $< 0,5$ UI/ml, administrar una dosis adicional, y después nuevo control serológico

Personas inmunocompetentes

- Pauta vacunación: 4 dosis IM (0, 3, 7 y 14-28 días). Alternativa: dos dosis el día 0 y una los días 7 y 14-28
- Ig antirrábica si ≤ 7 días desde la primera dosis de vacuna

Personas con inmunodepresión

- Pauta vacunación: 5 dosis IM (0, 3, 7, 14 y 21-28 días)
- Ig antirrábica si ≤ 7 días desde la primera dosis de vacuna
- Control serológico 2-4 semanas después de la dosis 5. En caso de título de anticuerpos $< 0,5$ UI/ml, administrar una dosis adicional, y después nuevo control serológico

- El lavado minucioso con agua y jabón, lo antes posible, es la medida preventiva más importante en todos los casos.
- Además, valorar la necesidad de tratamiento antibiótico y profilaxis antitetánica.
- Si se decide hacer profilaxis, iniciarla lo antes posible (no descartarla aún con cierta demora), y completarla preferiblemente con la misma vacuna.
- Vacunas disponibles: Rabipur y Vacuna antirrábica Merieux. Dosis: 1 ml vía IM o 0,1 ml vía ID.
- Inmunoglobulina: Imogan Rabia, 150 UI/ml. Dosis: 20 UI/kg, vía IM.
- Si están indicadas, la vacuna y la inmunoglobulina pueden administrarse durante el embarazo y la lactancia materna.
- No mezclar vacuna e inmunoglobulina en la misma jeringa y administrar en distintos lugares anatómicos.
- En caso de retraso de una dosis, no es necesario iniciar de nuevo la pauta vacunal, basta completarla.

Fuente: adaptado del Ministerio de Sanidad, julio de 2023

<https://vacunasaep.org/> • v.1, octubre de 2023 • @CAV_AEP