

# Vacunación de los lactantes frente al rotavirus

**Aspectos prácticos.** Fuentes: [fichas técnicas](#) de Rotarix y RotaTeq y [Manual de vacunas](#) en línea de la AEP



		<b>Rotarix</b> (2 dosis de 1,5 ml, vía oral)	<b>RotaTeq</b> (3 dosis de 2 ml, vía oral)
<b>Edad gestacional al nacer mínima</b>		27 semanas	25 semanas
<b>Intervalo mínimo entre dosis</b>		4 semanas	4 semanas
<b>Primera dosis (edad cronológica)</b>	Edad mínima	6 semanas	6 semanas
	Edad máxima	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preferentemente antes de las 13 semanas (hasta las 12 semanas + 6 días)</li> <li>• Obligatoriamente antes de las 20 semanas (hasta las 19 semanas + 6 días)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.ª dosis: antes de las 13 semanas (hasta las 12 semanas + 6 días)</li> <li>• 2.ª dosis: preferentemente hasta las 18 semanas (18 semanas + 6 días). Obligatoriamente antes de las 29 semanas (hasta las 28 semanas + 6 días)</li> </ul>
<b>Finalización de la pauta vacunal (edad cronológica)</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preferentemente antes de las 16 semanas</li> <li>• Obligatoriamente antes de las 24 semanas (hasta las 23 semanas + 6 días)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preferentemente antes de las 23 semanas</li> <li>• Obligatoriamente antes de las 33 semanas (hasta las 32 semanas + 6 días)</li> </ul>

Conservar entre +2 y +8 °C  
Estable 72 horas entre +8 y +25 °C y 24 horas entre +25 y +37 °C

Conservar entre +2 y +8 °C  
Estable 36 horas entre +8 y +25 °C