Sarampión (vacuna triple vírica, SRP)

Cronología de la vacunación en España, 1965-2024

V.6 / mayo, 2024
@CAV_AEP
https://vacunasaep.org/

1965
Autorización de una vacuna monocomponente cepa Beckenham 31

1968
Primera campaña vacunación en 11 provincias, niños 9-24 meses

1969
Se suspende la vacunación con la cepa Beckenham 31 por su reactogenicidad

1977
Autorización vacuna monocomponente cepa Schwartz (derivada de Edmonston)

1978
Vacuna monocomponente **sarampión a los 9 meses de edad**

1979
Vacunación **rubeola en niñas a los 11 años de edad**

1981
Vacuna triple vírica a los 15 meses* (sustituyendo a la monocomponente de los 9 meses)

1988-1996
Se añade la **segunda dosis de triple vírica a niños y niñas a los 11 años** (sustituyendo a la de rubeola de niñas) (implantación variable según CC. AA.)

1996
Triple vírica: **primera dosis 12-15 meses, segunda 11-13 años**

1999
Se adelanta la **segunda dosis de triple vírica a los 3-6 años**

2012
Triple vírica: **primera dosis a los 12 meses y segunda a los 3-4 años**

2018
Captación y vacunación (2 dosis) de los **adultos nacidos después de 1970** e inmigrantes sin antecedentes de vacunación o enfermedad (no hacer serología)

2022
Primera dosis de **triple vírica a los 11 meses administrada en circunstancias especiales**: válida a efectos de calendario

* Las **coberturas vacunales** fueron variables (en el tiempo y según CC. AA.) a partir de 1981. Globalmente, en 1985 80 % y en 1993 >90 %

CAV
Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones