Tabla 1. Inmunizaciones especialmente indicadas en los niños con cardiopatías congénitas			
Vacuna	Edad mínima de administración	Periodicidad	Tipo vacuna
Gripe	6 meses	Anual	6-23 meses: inactivada parenteral ≥2 años: atenuada intranasal (excepto si inmunosupresión)
SARS-CoV-2 (COVID-19)	6 meses	Anual	ARNm
Neumococo	6 semanas	Primovacunación (pauta 3+1 independientemente del tipo de VNC)	VNC15, VNC20

anterior)

anterior)

12 meses (se puede adelantar a los 6-11

meses de edad, aunque dosis no válida)

12 meses (se puede adelantar a los 6-10

meses de edad, aunque no contabiliza para

la pauta de 2 dosis. Si se adelanta a los 11

meses, sí contabiliza)

Recién nacido

Varicela\*

Triple vírica

Anticuerpo

monoclonal\*\*

Dosis de refuerzo según tipo de VNC

si se prevé inmunosupresión: intervalo

si se prevé inmunosupresión: intervalo

mínimo de 4 semanas respecto a la dosis

mínimo de 4 semanas respecto a la dosis

2<sup>a</sup> dosis a los 24 meses (se puede adelantar

2<sup>a</sup> dosis a los 24 meses (se puede adelantar

Siguientes temporadas, hasta cumplir los 24

recibidas con anterioridad