

Tabla 1. Inmunizaciones especialmente indicadas en los niños con cardiopatías congénitas			
Vacuna	Edad mínima de administración	Periodicidad	Tipo vacuna
Gripe	6 meses	Anual	6-23 meses: inactivada parenteral ≥2 años: atenuada intranasal (excepto si inmunosupresión)
SARS-CoV-2 (COVID-19)	6 meses	Anual	ARNm
Neumococo	6 semanas	Primovacunación (pauta 3+1 independientemente del tipo de VNC) Dosis de refuerzo según tipo de VNC recibidas con anterioridad	VNC15, VNC20
Varicela*	12 meses (se puede adelantar a los 6-11 meses de edad, aunque dosis no válida)	2ª dosis a los 24 meses (se puede adelantar si se prevé inmunosupresión: intervalo mínimo de 4 semanas respecto a la dosis anterior)	
Triple vírica	12 meses (se puede adelantar a los 6-10 meses de edad, aunque no contabiliza para la pauta de 2 dosis. Si se adelanta a los 11 meses, sí contabiliza)	2ª dosis a los 24 meses (se puede adelantar si se prevé inmunosupresión: intervalo mínimo de 4 semanas respecto a la dosis anterior)	
Anticuerpo monoclonal** frente al VRS	Recién nacido	Siguientes temporadas, hasta cumplir los 24 meses	