

VACUNACIÓN FRENTE AL MENINGOCOCO B EN ADOLESCENTES

1. Adolescentes NO vacunados previamente

- **Deben recibir una pauta completa:**
 - Edad: 12 años.
 - Dosis: 2 dosis de cualquiera de las dos vacunas.
 - Intervalos mínimos:
 - 4CMenB: 1 mes entre dosis.
 - MenB-fHbp: 6 meses entre dosis.


2. Adolescentes vacunados previamente con 4CMenB durante la infancia

a) Si recibieron una pauta completa y correcta:

- Vacunación antes de los 10 años:
 - Se recomienda 1 dosis de 4CMenB a los 12 años.
- Última dosis administrada a partir de los 10 años:
 - No es necesaria la dosis de los 12 años.

b) Si recibieron una pauta incompleta o incorrecta:

- Vacunación recomendada:
 - Dosis: 2 dosis de cualquiera de las dos vacunas.
 - Intervalos mínimos:
 - 4CMenB: 1 mes entre dosis.
 - MenB-fHbp: 6 meses entre dosis.
- Última dosis administrada a partir de los 10 años:
 - No es necesaria la dosis de los 12 años.



NOTA GENERAL

- MenB-fHbp solo puede administrarse a partir de los 10 años.
- Las vacunas frente al meningococo B NO son intercambiables.
- Para adolescentes mayores de 12 años, la recomendación es de tipo individual.