

Vacunas COVID-19. Recomendaciones del Ministerio de Sanidad [3]

<http://vacunasaep.org/>

@CAV_AEP

v.1 / 10 de noviembre de 2022



Vacuna	Composición / variantes	Uso	6 meses - 5 años	6-11 años Número de dosis e intervalo	12-17 años Número de dosis e intervalo
Nuvaxovid (Novavax)	Original / monovalente Adyuvante Matrix-M	Vacunación primaria	No	No	- Solo si las vacunas de ARNm están contraindicadas o no disponibles 2 dosis de 5 mcg, vía IM, al menos 3 semanas entre dosis (mínimo válido: 14 días) - Si infección previa. Antes de 1.ª dosis: una sola dosis, 4 semanas después. Entre 1.ª y 2.ª dosis: segunda dosis 4 semanas después de la infección. Excepción si alto riesgo (tabla 1): siempre 2 dosis, una vez recuperada la infección, segunda dosis al menos 4 semanas después de la primera dosis
		Refuerzo	No	No	No

Coadministración con otras vacunas admitida • Contraindicaciones: reacción alérgica grave, sistémica o inmediata a una dosis previa de la misma vacuna o a cualquier componente; peri/miocarditis tras una dosis previa • Posponer: enfermedad aguda grave; covid o síntomas sospechosos de covid