

Vacunas COVID-19. Recomendaciones del Ministerio de Sanidad [4]

<http://vacunasaep.org/>

@CAV_AEP

v.1 / 10 de noviembre de 2022



Tabla 1. Dosis adicional (tercera dosis) en la primovacunación en personas con alto riesgo

Vacuna		Uso	5-11 años	≥12 años
Comirnaty (BioNTech & Pfizer) Spikevax (Moderna)	Original / monovalente	Vacunación primaria	<ul style="list-style-type: none"> • Dos dosis (10 mcg) previas, incluso con antecedentes de infección • Dosis adicional (tercera dosis): 10 mcg • Al menos 8 semanas desde la segunda dosis • Si infección previa: tras la recuperación clínica 	<ul style="list-style-type: none"> • Dos dosis (30 mcg) previas, incluso con antecedentes de infección • Dosis adicional (tercera dosis): 30 mcg • Al menos 4 semanas desde la segunda dosis • Si infección previa: tras la recuperación clínica
			<p>Indicaciones (condiciones de alto riesgo):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Receptores de TPH o CAR-T, vacunados en los dos años tras el trasplante o tratamiento, en tratamiento inmunosupresor o que tengan EICH independientemente del tiempo desde TPH • Receptores de trasplante de órgano sólido • Fallo renal crónico. Tratamiento sustitutivo renal (hemodiálisis y diálisis peritoneal) • Tratamiento quimio- y radioterápico en los 6 meses previos por cualquier indicación • Inmunodeficiencias primarias. Infección por VIH con 200 cel/ml (analítica de los últimos 6 meses) • Fibrosis quística • Síndrome de Down con 40 o más años de edad (nacidos en 1981 o antes) • Tratamiento inmunosupresor 	