

# Vacunas COVID-19. Recomendaciones del Ministerio de Sanidad [5]

<http://vacunasaep.org/>

@CAV\_AEP

v.2 / 11 de noviembre de 2022



**Tabla 2. Indicaciones de la dosis de refuerzo en el otoño de 2022**

Vacuna		5-11 años	≥12 años
<b>Comirnaty</b> (BioNTech & Pfizer)  <b>Spikevax</b> (Moderna)	Vacunas según la edad: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Original / monovalente</li> <li>• Adaptada / bivalente</li> </ul>	Vacuna original / monovalente (Comirnaty 10 mcg)	Vacuna adaptada / bivalente (Comirnaty 30 mcg y Spikevax 100 mcg)
		<p><b>Personas de ≥60 años</b> (prioridad: ≥80 años, residentes en centros de mayores y discapacidad)</p> <p><b>Personas de 5-59 años de edad con</b> (prioridad: personas que precisen seguimiento médico periódico o que hayan sido hospitalizadas en el año precedente):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enfermedades crónicas cardiovasculares, neurológicas y respiratorias (incluyendo displasia bronco-pulmonar, fibrosis quística y asma); diabetes mellitus; obesidad mórbida (IMC ≥40 en adultos, ≥35 en adolescentes o ≥3 DS en niños); enfermedad renal crónica y síndrome nefrótico; hemoglobinopatía y anemia; hemofilia, otros trastornos de la coagulación y hemorrágicos crónicos, receptores de hemoderivados y transfusiones múltiples; enfermedad hepática crónica, incluyendo alcoholismo crónico; enfermedad neuromuscular grave; enfermedad celíaca; enfermedad inflamatoria crónica</li> <li>• Inmunosupresión (incluyendo las inmunodeficiencias primarias y la infección por VIH, por fármacos, incluyendo tratamiento con eculizumab, en los receptores de trasplantes y déficit de complemento); asplenia o disfunción esplénica grave</li> <li>• Cáncer y hemopatías malignas</li> <li>• Implante coclear o en espera del mismo; fístula de líquido cefalorraquídeo</li> <li>• Trastornos y enfermedades con disfunción cognitiva: síndrome de Down y otros</li> <li>• Personas institucionalizadas de manera prolongada (prioridad: centros de discapacidad)</li> <li>• Mujeres embarazadas (cualquier trimestre) y durante el puerperio (hasta los 6 m tras el parto si no se han vacunado en el embarazo)</li> <li>• Convivientes de personas con alto riesgo (tabla 1)</li> <li>• Profesionales de los centros sanitarios y sociosanitarios</li> </ul>	