

Vacunación de la covid con vacunas de ARNm

Dudas frecuentes: intervalos entre dosis e intercambiabilidad

		Comirnaty (Pfizer / BioNTech)	Covid-19 Vaccine (Moderna)
Documentos de referencia		<ul style="list-style-type: none">• EMA: ficha técnica (28/ene, 2021)• Ministerio de Sanidad: guía técnica (25/ene, 2021)	<ul style="list-style-type: none">• EMA: ficha técnica (26/ene, 2021)• Ministerio de Sanidad: guía técnica (25/ene, 2021)
Intervalo entre dosis recomendado		21 días <ul style="list-style-type: none">• EMA, 28/ene: 3 semanas• AEMPS, 22/ene: 21-28 días	28 días
Intervalo distinto	Menor	<ul style="list-style-type: none">• 19-20 días: dosis válida• ≤18 días: dosis no válida, repetir a los 21 días	<ul style="list-style-type: none">• 25-27 días: dosis válida• ≤24 días: dosis no válida, repetir a los 28 días
	Mayor	Administrar en cuanto sea posible, no es necesario reiniciar la pauta	
Intercambiabilidad		<ul style="list-style-type: none">• No (debe completarse la pauta vacunal con la misma vacuna)• En caso de no conocer qué vacuna se administró en la primera dosis o en caso de no disponibilidad de alguna vacuna y si se estima necesario completar sin demora la pauta vacunal, se puede administrar la segunda dosis con la vacuna disponible	