



Vacunas del viajero (población infantil)(CAV AEP agosto 2025)

Vacunas	Venta en farmacias	Tipo de vacuna	Vía	Pauta	Interferencias	Edad	Intervalo mínimo Previo viaje	Duración de la protección
Cólera	• Sí, con receta médica en farmacias	Recombinante, inactivada: • Dukoral (problemas de suministro)	Oral	• 2-6 años: 3 dosis (0, 1 y 1 semana) • ≥6 años: 2 dosis (0 y 1 semana)	Ninguna	≥2 a	8 días	• 2-6 años: 6 meses • ≥6 años: 2 años
		Recombinante, bacterias vivas atenuadas: • Vaxchora	Oral	• 1 dosis, con estómago vacío, una hora antes de una comida o bebida	• Antimaláricos • Antibióticos	≥2 a	10 días	Desconocida
Dengue	• Sí, con receta médica solo en farmacias con acceso a medicamentos extranjeros	Recombinante, virus vivos atenuados: • Qdenga	SC	• 2 dosis (0 y 3 meses)	• Hemoderivados e IgG: 3 meses • Inmunosupresores: 4 semanas	≥4 a	10 días	Desconocida
Encefalitis centroeuropea	• No, disponible solo en centros autorizados	Inactivada: • Encepur • TicoVac (FSME-Immun)	IM	• 3 dosis (0, 1-3 meses y 6-15 meses); refuerzo a los 3 años • Acelerada: 3 dosis (0, 7 y 21 días); refuerzo a los 12-18 meses	Ninguna	≥1 a	15 días (2.ª dosis)	12-18 meses
Encefalitis japonesa	• Sí, con receta médica en farmacias	Inactivada: • Ixiaro	IM	• 2 dosis (0 y 28 días); 2 a 35 meses: dosis de 0,25 ml; ≥3 años: 0,5 ml • Acelerada: 2 dosis (0 y 7 días); refuerzo al año si persiste el riesgo	Ninguna	≥2 m	7 días	1 año
Fiebre amarilla	• No, disponible solo en centros autorizados	Virus vivos atenuados: • Stamaril	SC	• 1 dosis • Vacunación, al menos, 10 días antes de la exposición	Vacunas vivas parenterales	≥9 m	10 días	Toda la vida



Vacunas	Venta en farmacias	Tipo de vacuna	Vía	Pauta	Interferencias	Edad	Intervalo mínimo Previo viaje	Duración de la protección
Fiebre tifoidea	Sí, con receta médica en farmacias	Inactivada: Typhim Vi	IM	1 dosis	Ninguna	≥2 a	7 días	2-3 años
		Atenuada: Vivotif	Oral	3 dosis (0, 3 y 5 días), estómago vacío, como mínimo una hora antes de una comida	• Antimaláricos • Antibióticos • Vacuna VPO	≥5 a	7 días	3 años
Hepatitis A	Sí, con receta médica en farmacias	Inactivada: • Havrix 720 • Vaqta 25	IM	2 dosis; Havrix 0 y 6-12 meses; Vaqta 25 0 y 6-18 meses	Ninguna	≥12 m	14 días	Toda la vida
Meningococos ACWY	Sí, con receta médica en farmacias	Inactivada: • Nimenrix • Menquadfi • Menveo	IM	1 a 3 dosis según edad	Ninguna	≥6 sem Nimenrix ≥12 m MenQuadfi ≥2 a Menveo	10 días	Desconocida
Rabia	No, disponible solo en centros autorizados	Inactivada: • Rabipur • Antirrábica Merieux	IM/ID	• Preexposición: 2 dosis (0 y 7 días) • Posexposición: 4 dosis (0, 3, 7 y 14-28 días)	Ninguna	Sin limitaciones	30 días	2-5 años

- Más información en: CAV-AEP <https://vacunasaep.org/>; CAV-AEP, inmunizaciones del niño viajero <https://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-13>; ANDAVAC, vacunación para viajes internacionales <https://www.andavac.es/vacunacion-viajeros-internacionales/>; CDC, Yellow Book 2026 <https://www.cdc.gov/yellow-book/index.html>
- En cualquier caso se recomienda pedir cita en un centro de Vacunación Internacional (<https://sisaex-vac-cita.mscbs.gob.es/sanitarios/consejos/datosViajero/iniciar.do>) y completar/adelantar vacunaciones sistemáticas según corresponda, respetando edades e intervalos mínimos.